

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Клей БФ-6 ВЕРТЕКС

Регистрационный номер: ЛС-001299

Торговое наименование: Клей БФ-6 ВЕРТЕКС

Лекарственная форма: раствор для наружного применения спиртовой

Состав

В 1 г препарата содержится: поливинилбутирал (поливинилбутираль) – 97,0 мг, дибутилфталат – 35,0 мг, касторовое масло – 17,5 мг, фенолформальдегидная смола (лак бакелитовый) – 16,5 мг, канифоль – 8,5 мг, этанол 95 % (этиловый спирт 95 %) – 825,5 мг.

Описание

Прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до желтого с красноватым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое средство.

Код АТХ

D08AE

Фармакологическое действие

Клей БФ-6 ВЕРТЕКС оказывает ранозаживляющее и антисептическое действие. Используется как бактерицидное и изолирующее средство, способствует заживлению мелких повреждений кожи вследствие образования на их поверхности изолирующей пленки, стойкой к механическим и химическим воздействиям.

Показания к применению

Препарат применяют для обработки микротравм (ссадин, царапин, порезов и других мелких повреждений кожи), послеоперационных швов.

Противопоказания для применения

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 1 года.

Способ применения и дозы

Наружно.

Перед нанесением препарата участок кожи тщательно очищают от загрязнения. Ватным или марлевым тампоном останавливают кровотечение и просушивают место, которое необходимо покрыть клеем. Препарат наносят непосредственно на поврежденную

поверхность тонким слоем, захватывая окружающие здоровые ткани. В случае нарушения целостности пленки сверху на нее наносят новую пленку.

Пленка образуется в течение 2-5 минут после нанесения препарата и прочно удерживается на коже на протяжении 2-3 дней.

Меры предосторожности при применении

Препарат предназначен только для наружного применения. Избегать попадания на слизистые оболочки глаз.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Побочное действие

Жжение в месте нанесения, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Данные о нежелательных проявлениях лекарственного взаимодействия отсутствуют.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

На основании существующих данных применение Клея БФ-6 ВЕРТЕКС в терапевтических дозах при беременности не оказывает отрицательного влияния на развивающийся плод.

Возможно применение в период лактации.

Применение при хронических заболеваниях

Не отмечено влияние применения препарата на течение хронических заболеваний.

Влияние на способность управления транспортными средствами, механизмами

Нет данных о влиянии препарата, примененного в терапевтических дозах, на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения спиртовой.

По 10 г, 15 г, 25 г или 30 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С вдали от источников нагрева и открытого огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение

АО «ВЕРТЕКС», Россия

Юридический адрес: 197350, г. Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д. 62, лит. А.

Производитель

АО «ВЕРТЕКС», Россия

Адрес производства: г. Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д. 62, лит. А.

Организация, принимающая претензии потребителей:

АО «ВЕРТЕКС», Россия

199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24-линия, д. 27, лит. А.

Тел./факс: (812) 322-73-38