


Листок-вкладыш – информация для пациента

Тилорон – ВЕРТЕКС, 125 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: тилорон



Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 4 – 5 дней, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Тилорон – ВЕРТЕКС, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Тилорон – ВЕРТЕКС.
3. Применение препарата Тилорон – ВЕРТЕКС.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Тилорон – ВЕРТЕКС.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Тилорон – ВЕРТЕКС, и для чего его применяют

Препарат Тилорон – ВЕРТЕКС содержит действующее вещество тилорон и относится к группе веществ: противовирусные средства системного действия; противовирусные средства прямого действия; другие противовирусные средства.

Показания к применению

Препарат Тилорон – ВЕРТЕКС применяется в составе комплексной терапии у взрослых от 18 лет для лечения:

- гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ);

- герпетической инфекции.

Также препарат Тилорон – ВЕРТЕКС применяется для профилактики гриппа и других ОРВИ у взрослых от 18 лет.

Если улучшение не наступило в течение 4-х дней или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Тилорон – ВЕРТЕКС

Противопоказания

Не принимайте препарат Тилорон – ВЕРТЕКС:

- если у Вас аллергия на тилорон или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если Вы беременны или кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Тилорон – ВЕРТЕКС проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Дети

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 7 лет поскольку эффективность и безопасность не установлены. Не давайте препарат детям в возрасте от 7 до 18 лет, в связи с невозможностью обеспечить режим дозирования.

Другие препараты и препарат Тилорон – ВЕРТЕКС

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат Тилорон – ВЕРТЕКС можно принимать вместе с антибиотиками и другими средствами лечения вирусных и бактериальных заболеваний.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата Тилорон – ВЕРТЕКС проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Не принимайте препарат Тилорон – ВЕРТЕКС при беременности.

Грудное вскармливание

Не принимайте препарат Тилорон – ВЕРТЕКС в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Тилорон – ВЕРТЕКС не оказывает отрицательного влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятиями другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Препарат Тилорон – ВЕРТЕКС содержит лактозу

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом препарата Тилорон – ВЕРТЕКС.

3. Прием препарата Тилорон – ВЕРТЕКС

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При лечении гриппа и других ОРВИ в случае сохранения симптомов заболевания более 4-х дней Вам следует проконсультироваться с врачом.

Рекомендуемая доза

Лечение гриппа и других ОРВИ у взрослых в возрасте от 18 лет

Рекомендуемая доза – 1 таблетка (125 мг) 1 раз в сутки в 1, 2, 4, 6, 8, 10 дни лечения. На курс лечения – 6 таблеток (750 мг).

Лечение герпетической инфекции у взрослых в возрасте от 18 лет

Рекомендуемая доза – 1 таблетка (125 мг) 1 раз в сутки в 1 и 2 дни лечения, затем по 1 таблетке (125 мг) 1 раз в сутки через день (на 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 дни лечения или более, в зависимости от продолжительности лечения). На курс лечения – 10–20 таблеток (1,25–2,5 г).

Профилактика гриппа и других ОРВИ у взрослых в возрасте от 18 лет

Рекомендуемая доза – 1 таблетка (125 мг) 1 раз в неделю в течение 6 недель. На курс профилактики – 6 таблеток (750 мг).

Путь и (или) способ введения

Принимайте препарат после еды, запивая водой.

Если Вы приняли препарата Тилорон – ВЕРТЕКС больше, чем следовало

Если Вы приняли препарата Тилорон – ВЕРТЕКС больше, чем следовало, сообщите об этом лечащему врачу.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Тилорон – ВЕРТЕКС может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Следующие нежелательные реакции могут проявляться по-разному у каждого конкретного пациента и не исключают необходимость консультации с врачом:

- высыпания на коже, зуд, отечность, приступы чихания (аллергические реакции);
- дискомфорт в области живота, может сопровождаться изжогой, тошнотой, отрыжкой, вздутием, диареей (диспепсические явления);
- ощущение холода, потливость, бледность кожи, резкое понижение температуры тела, снижение аппетита (кратковременный озноб).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленных на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.

Телефон: 8 (800) 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru>

5. Хранение препарата Тилорон – ВЕРТЕКС

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после слов «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Тилорон – ВЕРТЕКС содержит

Действующим веществом является тилорон.

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 125 мг тилорона дигидрохлорида.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микрокристаллическая 101, лактозы моногидрат (см. раздел 2), крахмал картофельный, кроскармеллоза натрия, повидон К-17 (поливинилпирролидон низкомолекулярный), кальция стеарат; пленочная оболочка: [гипромеллоза, титана диоксид, краситель железа оксид желтый (железа оксид), макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000), краситель железа оксид красный (железа оксид)] или [сухая смесь для пленочного покрытия, содержащая гипромеллозу, титана диоксид, краситель железа оксид желтый (железа оксид), макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000), краситель железа оксид красный (железа оксид)].

Препарат Тилорон – ВЕРТЕКС содержит лактозу (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Тилорон – ВЕРТЕКС и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой светло-коричневого цвета. На поперечном разрезе ядро оранжевого цвета.

По 1, 5 или 6 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 6 или 10 таблеток в банку из полиэтилена низкого давления, укупоренную крышкой натягиваемой с контролем первого вскрытия из полиэтилена высокого давления. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей или самоклеящуюся.

6 контурных ячейковых упаковок по 1 таблетке, 2 контурные ячейковые упаковки по 5 таблеток, 1 контурную ячейковую упаковку по 6 таблеток или одну банку вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Допускается комплектация по 2 картонные упаковки (пачки) в групповую упаковку (транспортную тару) из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Россия

АО «ВЕРТЕКС»

Адрес: 197350, г. Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д. 62, лит. А.

Телефон: 8 (800) 2000 305

Адрес электронной почты: vertex@vertex.spb.ru

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:

Россия

АО «ВЕРТЕКС»

Адрес: 197350, г. Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д. 62, лит. А.

Телефон: 8 (800) 2000 305

Адрес электронной почты: pharmacovigilance@vertex.spb.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза:
<https://eec.eaeunion.org>.