

Листок-вкладыш – информация для пациента

Мемантин – ВЕРТЕКС, 10 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Мемантин – ВЕРТЕКС, 20 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

АО «ВЕРТЕКС»

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Зиминова ЕИ

Ф.И. Перед приемом препарата полностью прочтайте листок-вкладыш, поскольку в нем

Действующее вещество: мемантин.

содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

### Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Мемантин – ВЕРТЕКС, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Мемантин – ВЕРТЕКС.
3. Прием препарата Мемантин – ВЕРТЕКС.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Мемантин – ВЕРТЕКС.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

### 1. Что из себя представляет препарат Мемантин – ВЕРТЕКС, и для чего его применяют

Действующим веществом препарата Мемантин – ВЕРТЕКС является мемантинина гидрохлорид, который относится к фармакотерапевтической группе под названием: «психоаналептики; средства для лечения деменции; другие средства для лечения деменции».

Потеря памяти при болезни Альцгеймера происходит из-за нарушения передачи сигналов в головном мозге. Мозг содержит так называемые рецепторы N-метил-D-аспартата (NMDA), которые участвуют в передаче нервных импульсов – сигналов, важных для обучения и памяти. Мемантин – ВЕРТЕКС воздействует на эти NMDA-рецепторы, улучшая передачу нервных сигналов и память.

**СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ  
от 22.12.2023 № 26940  
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)**

### **Показания к применению**

Препарат Мемантин – ВЕРТЕКС применяется у взрослых в возрасте от 18 лет для лечения нарушений памяти и мышления (деменции) средней и тяжелой степени выраженности при болезни Альцгеймера.

Если улучшение не наступило, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

### **2. О чем следует знать перед приемом препарата Мемантин – ВЕРТЕКС**

#### **Противопоказания**

##### **Не принимайте препарат Мемантин – ВЕРТЕКС:**

- если у Вас аллергия на мемантин гидрохлорид или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас диагностирована тяжелая печеночная недостаточность;
- если Вы беременны;
- если Вы кормите грудью;
- если Ваш возраст моложе 18 лет.

Если Вы считаете, что любое из перечисленного относится к Вам, сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

#### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед приемом препарата Мемантин – ВЕРТЕКС проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Обязательно предупредите Вашего лечащего врача, если какой-либо из нижеуказанных пунктов относится к Вам:

- если у Вас повышена функция щитовидной железы (тиреотоксикоз);
- если у Вас в прошлом были судороги;
- если Вы недавно перенесли инфаркт миокарда (сердечный приступ), или если Вы страдаете от застойной сердечной недостаточности или от неконтролируемой гипертонии (высокого кровяного давления);
- если Вы используете лекарственные препараты под названием амантадин (для лечения болезни Паркинсона), кетамин (вещество, обычно используемое в качестве

анестетика), декстрометорфан (обычно используется для лечения кашля) и следует избегать одновременного применения других NMDA-антагонистов;

- если у Вас тяжелая почечная недостаточность;
- если у Вас печеночная недостаточность;
- если Вы резко перешли от мясной к вегетарианской диете.

#### **Дети и подростки**

Не давайте препарат детям от 0 до 18 лет, поскольку безопасность и эффективность применения препарата Мемантин – ВЕРТЕКС у детей и подростков не установлены.

#### **Другие препараты и препарат Мемантин – ВЕРТЕКС**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Вашему врачу может потребоваться изменить дозы этих лекарственных препаратов или принять другие меры предосторожности. В некоторых случаях Вам придется прекратить прием некоторых лекарственных препаратов или препарата Мемантин – ВЕРТЕКС. Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если Вы принимаете какой-либо из нижеперечисленных препаратов:

- леводопа, амантадин – препараты для лечения болезни Паркинсона;
- барбитураты – успокаивающие и снотворные препараты;
- нейролептики – препараты для лечения психических заболеваний;
- дантролен, баклофен – препараты для расслабления мышц;
- противосудорожные средства;
- кетамин – препарат, используемый для наркоза;
- фенитоин – противоэпилептическое средство;
- декстрометорфан – противокашлевое средство;
- циметидин, ранитидин – препараты для лечения заболеваний желудка;
- прокаинамид, хинидин – препараты для лечения нарушений сердечного ритма;
- хинин – обезболивающий, жаропонижающий препарат, препарат для лечения малярии;
- никотин;
- гидрохлоротиазид – мочегонное средство;
- непрямые антикоагулянты – препараты, понижающие свертываемость крови и препятствующие образованию тромбов;

**СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ  
от 22.12.2023 № 26940  
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)**

- препараты для лечения депрессии;
- глибенкламид, метформин – препараты для лечения сахарного диабета;
- донепезил – препарат для лечения болезни Альцгеймера.

### **Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### *Беременность*

Мемантин – ВЕРТЕКС не следует применять во время беременности.

#### *Грудное вскармливание*

Неизвестно, проникает ли мемантина гидрохлорид в грудное молоко. Женщины, принимающие Мемантин – ВЕРТЕКС, не должны кормить грудью ребенка.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Мемантин – ВЕРТЕКС может вызывать изменение скорости реакции, поэтому, если Вы получаете лечение в амбулаторных условиях, следует соблюдать особую осторожность при вождении автотранспорта или управлении механизмами. Кроме того, если у Вас болезнь Альцгеймера на стадии умеренной и тяжелой деменции, то, скорее всего, у Вас нарушена способность к вождению автотранспорта и управлению сложными механизмами.

### **Препарат Мемантин – ВЕРТЕКС содержит лактозы моногидрат**

Препарат Мемантин – ВЕРТЕКС содержит лактозы моногидрат. Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

### **3. Прием препарата Мемантин – ВЕРТЕКС**

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### **Рекомендуемая доза:**

Максимальная суточная доза составляет 20 мг. Для снижения риска нежелательных реакций начальную дозу повышают до поддерживающей путем постепенного повышения (титрования) на 5 мг в неделю в течение первых 3-х недель следующим образом:

**СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ  
от 22.12.2023 № 26940  
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)**

1-ая неделя (день 1-7): назначают по 5 мг в сутки.

2-ая неделя (день 8-14): назначают по 10 мг в сутки.

3-ая неделя (день 15-21): назначают по 15 мг в сутки.

4-ая неделя и далее: назначают по 20 мг в сутки.

Рекомендуемая поддерживающая доза составляет 20 мг в сутки.

Для облегчения подбора дозы (титрования) доступны таблетки с другими дозировками.

#### *Пациенты с нарушением функции почек*

Если у Вас нарушена функция почек, Ваш врач подберет дозу, соответствующую Вашему состоянию. В этом случае врач должен проводить мониторинг функции почек в указанные сроки.

#### *Пациенты с нарушением функции печени*

Если у Вас нарушена функция печени, Ваш врач подберет дозу, соответствующую Вашему состоянию. Если нарушение функции печени имеет тяжелую степень, не принимайте этот препарат.

#### **Путь и (или) способ введения**

Препарат следует принимать внутрь, один раз в день в одно и то же время, независимо от приема пищи.

#### **Продолжительность терапии**

Продолжительность лечения препаратом для Вас определит лечащий врач.

#### **Если Вы приняли препарата Мемантин – ВЕРТЕКС больше, чем следовало**

Если Вы приняли препарата Мемантин – ВЕРТЕКС больше, чем следовало, сообщите об этом врачу или немедленно обратитесь в медицинское учреждение.

#### **Если Вы забыли принять препарат Мемантин – ВЕРТЕКС**

Если Вы забыли принять препарат, примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу (две дозы в одно и то же время), чтобы компенсировать пропущенную дозу.

#### **Если Вы прекратили прием препарата Мемантин – ВЕРТЕКС**

**СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ**

**от 22.12.2023 № 26940**

**(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)**

Не прекращайте прием препарата Мемантин – ВЕРТЕКС без консультации со своим врачом. Принимайте этот лекарственный препарат регулярно в течение периода времени, назначенного врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

#### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Мемантин – ВЕРТЕКС может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

*Часто – могут возникать не более чем у 1 человека из 10:*

- гиперчувствительность к компонентам препарата,
- сонливость,
- головокружение,
- нарушение равновесия,
- повышение артериального давления,
- одышка,
- запор,
- повышение биохимических показателей функции печени,
- головная боль.

*Нечасто – могут возникать не более чем у 1 человека из 100:*

- грибковые инфекции,
- спутанность сознания,
- галлюцинации,
- нарушение походки,
- сердечная недостаточность,
- венозный тромбоз/тромбоэмболия,
- тошнота,
- рвота,
- утомляемость.

*Очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10000:*

- судороги.

*Неизвестно – исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно:*

- психотические реакции,

**СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ  
от 22.12.2023 № 26940  
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)**

- панкреатит,
- гепатит.

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях лекарственного препарата напрямую через систему сообщений государств-членов Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.

Телефон: 8 (800) 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

[www.roszdravnadzor.gov.ru](http://www.roszdravnadzor.gov.ru)

#### **5. Хранение препарата Мемантин – ВЕРТЕКС**

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после слов «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

#### **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

**Препарат Мемантин – ВЕРТЕКС** содержит

Действующим веществом является мемантин.

Мемантин – ВЕРТЕКС, 10 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 10 мг мемантина (в виде гидрохлорида).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микрокристаллическая 101, кальция гидрофосфат дигидрат, кроскармеллоза натрия,

**СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ**

**от 22.12.2023 № 26940**

**(ПОСЛЕПОВАТЕЛЬНОСТЬ 001)**

лактозы моногидрат (см. раздел 2), гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), тальк, кремния

диоксид коллоидный, магния стеарат.

Пленочная оболочка: гипромеллоза, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), тальк, титана диоксид или сухая смесь для пленочного покрытия, содержащая гипромеллозу, гипролозу (гидроксипропилцеллюлозу), тальк, титана диоксид.

**Мемантин – ВЕРТЕКС, 20 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**

Каждая таблетка содержит 20 мг мемантина (в виде гидрохлорида).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микрокристаллическая 101, кальция гидрофосфат дигидрат, кроскармеллоза натрия, лактозы моногидрат (см. раздел 2), гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), тальк, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

Пленочная оболочка: гипромеллоза, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), тальк, титана диоксид, краситель железа оксид желтый (железа оксид) или сухая смесь для пленочного покрытия, содержащая гипромеллозу, гипролозу (гидроксипропилцеллюлозу), тальк, титана диоксид, краситель железа оксид желтый (железа оксид).

**Внешний вид препарата Мемантин – ВЕРТЕКС и содержимое упаковки**

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

**Мемантин – ВЕРТЕКС, 10 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой.**

Продолговатые двояковыпуклые таблетки, имеющие риску с каждой стороны, покрытые пленочной оболочкой белого цвета. На поперечном разрезе ядро белого или почти белого цвета.

**Мемантин – ВЕРТЕКС, 20 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой.**

Продолговатые двояковыпуклые таблетки, имеющие риску с каждой стороны, покрытые пленочной оболочкой желтого цвета. На поперечном разрезе ядро белого или почти белого цвета.

10, 15 или 30 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

30 таблеток в банке из полиэтилена высокой плотности, укупоренной крышкой полимерной натягиваемой с контролем первого вскрытия.

3, 6 или 9 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток, 2, 4 или 6 контурных ячейковых

**СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ**

**от 22.12.2023 № 26940**

**(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)**

упаковок по 15 таблеток, 1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки по 30 таблеток или одна банка вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

Россия, АО «ВЕРТЕКС»

Адрес: 197350, г. Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д. 62, лит. А.

Телефон: 8 (800) 2000 305

Адрес электронной почты: vertex@vertex.spb.ru

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:

Россия, АО «ВЕРТЕКС»

Адрес: 197350, г. Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д. 62, лит. А.

Телефон: 8 (800) 2000 305

Адрес электронной почты: pharmacovigilance@vertex.spb.ru

**Листок-вкладыш пересмотрен**

**Прочие источники информации**

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза <http://eec.eaeunion.org/>.